

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОГО ЛЕОНАРДИТУ ПО ОСНОВНИХ КУЛЬТУРАХ

◆ Рідкий Леонардит Виробник: ТОВ «СІСТЕМС» (Systems®)

Продукт: ЛЕОНАРДИТ, рідкий ТМ Systems®
(природно-органічний продукт, універсальне органічне добриво)

Характеристика продукту

Натуральний органічний біостимулятор на основі гумінових та фульвокислот.

Основні функції:

- стимуляція розвитку кореневої системи
- антистресова дія (посуха, гербіцидне навантаження, температурні коливання)
- підвищення коефіцієнта використання мінерального живлення (NPK)
- активація ґрунтової мікробіоти
- підвищення врожайності та якості продукції

СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ПО КУЛЬТУРАХ

1. Зернові колосові (пшениця, ячмінь)

Схема внесення

Фаза кушення (ВВСН 21–29)

Норма: 0,8–1,0 л/га (фоліарно)

Дія:

- стимуляція коренеутворення
- посилення фотосинтезу
- формування продуктивних стебел

Вихід у трубку (ВВСН 30–32)

Норма: 1,0–1,5 л/га

Дія:

- оптимізація азотного живлення
- підвищення стійкості до погодних стресів

Після гербіцидного стресу

Норма: 0,5–1,0 л/га

Дія:

- швидке відновлення вегетації
- зменшення фітотоксичного навантаження

Очікуваний результат:

Приріст врожайності: **+8–15%**

2. Соняшник

Схема внесення

Фаза 4–6 листків (ВВСН 14–16)

Норма: 1,0–1,5 л/га

Дія:

- інтенсивний розвиток кореневої системи
- підвищення посухостійкості

Перед бутонізацією (ВВСН 51–55)

Норма: 1,5–2,0 л/га

Дія:

- підтримка формування кошика
- закладка потенціалу врожайності

Результат:

- підвищення олійності
- збільшення маси насіння
- стабільність при посузі

3. Кукурудза

Схема внесення

Фаза 3–5 листків (ВВСН 13–15)

Норма: 1,0–1,5 л/га

Дія:

- розвиток первинної та вторинної кореневої системи

Фаза 8–10 листків (ВВСН 18–20)

Норма: 1,5–2,0 л/га

Дія:

- підвищення засвоєння азоту
- посилення фотосинтетичної активності

Результат:

- збільшення маси качана
- стабільність врожаю при стресах

4. Овочеві культури (томат, огірок, перець)

Фертигація

Норма: 2–4 л/га кожні 10–14 днів

Фоліарні обробки

Норма: 0,5–1,0 л/га

Результат:

- підвищення відсотка зав'язування
- зниження скидання квітів
- покращення смакових якостей

🍏 5. Плодові сади

Програма внесення

Рання весна (вихід із зимового стресу)

Норма: 2–3 л/га

Перед цвітінням

Норма: 1,5–2,0 л/га

Після формування зав'язі (фертигація)

Норма: 2–3 л/га

Результат:

- покращення утримання зав'язі
- збільшення калібру плодів
- підвищення стійкості до температурних стресів

🍇 6. Виноград

Сезонна схема

3–4 обробки за сезон

Норма: 1,0–2,0 л/га

Результат:

- підвищення цукристості
- збільшення маси грона
- активація ґрунтової мікрофлори

ЗАГАЛЬНІ АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Підвищення ефективності використання мінеральних добрив: **+15–25%**
- Відновлення структури ґрунту
- Потужна антистресова дія
- Сумісність з органічними технологіями
- Відсутність фітотоксичності
- Безпечний для рослин та ґрунтової біоти

🏢 АГРОНОМІЧНА ЛОГІКА ЗАСТОСУВАННЯ

Основні періоди максимальної ефективності:

- старт росту культури
- фази інтенсивного росту біомаси
- генеративні фази формування врожаю
- періоди стресового навантаження



З повагою,
Комерційний відділ
ТОВ «СІСТЕМС»
Відділ агротехнологій
Тел.: +38 097 595 42 77
E-mail: systems.office10@gmail.com